



การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม ต้นแบบในยีน *CYP2D6* และ *CYP2C19* ที่มี ผลต่อการตอบสนองต่อยา

มัทนา จงกา, วท.ม. (ชีววิทยา)*
ธัญภัทร วณิชชานนท์, วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)*
มาลี ปรีชาพลสิทธิ์, ภ.บ.**
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์, พ.บ.***

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยแต่ละคนมีการตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษาแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความผันแปรของลำดับเบสของยีนในกลุ่ม *Cytochrome P450* โดยเฉพาะอย่างยิ่งยีน *CYP2D6* และยีน *CYP2C19* ผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีการตรวจ *CYP2D6* และ *CYP2C19* และนำไปศึกษาในผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 65 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้า, กลุ่มที่ไม่มีประวัติโรคทางจิตเวช และกลุ่มที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจำนวน 24, 24 และ 17 ราย โดยการทำให้ long PCR และ bidirectional sequencing ผลการตรวจพบว่ายีน *CYP2D6* พบ *10/*10 มากที่สุด ส่วนในยีน *CYP2C19* พบ *1/*1 มากที่สุด และการทำนายการตอบสนองต่อยาของเอนไซม์ที่สร้างได้จากสองยีนในผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองแบบ Extensive metabolizer (EM) อย่างไรก็ตามพบว่า Poor Metabolizer (PM) นั้นพบในยีน *CYP2C19* ของผู้ป่วย 1 รายที่มีประวัติของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ยังพบในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า 3 ราย และพบในผู้ที่ไม่มีประวัติโรคทางจิตเวช 3 ราย วิธีการที่ได้รับการพัฒนานี้สามารถตรวจยีน *CYP2D6* ได้ไม่น้อยกว่า 17 อัลลีลที่สำคัญและ *CYP2C19* ได้ 3 อัลลีล การวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์รูปแบบจีโนไทป์และความผันแปรของยีนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ และนำมาใช้ในงานบริการซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการตรวจได้ในอนาคต

คำสำคัญ ชุดตรวจวิเคราะห์ ยีน *CYP2D6* ยีน *CYP2C19*

* นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล
** เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล
*** นายแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล



Development of Genotyping Method of *CYP2D6* and *CYP2C19* for Pharmacogenetics test

Mattana Chongka, M.Sc.*

Thanyapat Wanitchanon, M.Sc.*

Malee Preechapolsit, B.Sc. (Pharmacy)**

Verayuth Praphanphoj, M.D.Ph.D.***

Abstract

Differences in drugs response and adverse drug reaction (ADR) in individuals are mainly due to genetic variations in the *Cytochrome P450*, especially in *CYP2D6* and *CYP2C19*. However, the cost for comprehensive genotyping is very high. Therefore we have developed genotyping method using long PCR, conventional PCR and bidirectional sequencing and tested it in clinical samples. Out of 65 samples, 24 samples were Major Depressive Disorder (MDD) patients, 24 samples were the samples with no history of any mental disorders (control) and 17 samples were patients with history of adverse drug reaction. We found that the highest genotype frequency in *CYP2D6* and *CYP2C19* were *10/*10 and *1/*1, respectively. Extensive Metabolizer (EM) for *CYP2D6* and *CYP2C19* were found in most of samples whereas Poor Metabolizer (PM) for *CYP2C19* were found in 1 sample with history of ADR and in 3 MDD samples and 3 control samples. In summary this developed genotyping method can detect at least 17 alleles in *CYP2D6* and 3 alleles in *CYP2C19* which can be used for prediction of enzyme activity and will be used as primers to test other pharmacogenetics genes and to offer as routine clinical test in the near future.

Key words genotyping method, *CYP2D6*, *CYP2C19*

บทนำ

การศึกษาในด้านเภสัชพันธุศาสตร์เป็นการศึกษาในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนต่างๆ ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษา ปัจจุบันมีการนำความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ของยา มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย โดยยีนหลักที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงยา (drug metabolizing) จำนวนมากในร่างกาย ได้แก่ ยีนที่อยู่ในกลุ่ม cytochrome P450 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยีน *CYP2D6* และยีน *CYP2C19*¹

ความแตกต่างของการทำงานของยีน *CYP2D6* และ *CYP2C19* นั้นเกิดจากความหลากหลายของลำดับเบสของดีเอ็นเอโดยส่วนใหญ่จะเป็น Single Nucleotide polymorphism (SNP) นอกนั้นจะเป็นแบบ deletion, insertion, inversion, gross deletion และ gross duplication ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้โครงสร้างของ mRNA และโครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การทำงานของยีนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับเบสแต่ละแบบด้วย

อย่างไรก็ตามการตรวจยีน *CYP2D6* และ *CYP2C19* ให้ครอบคลุมจีโนไทป์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงยานั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีการตรวจยีน *CYP2D6*,

CYP2C19 เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและมีความถูกต้องแม่นยำสูง

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน *CYP2D6* ยีน *CYP2C19*
2. หาความถี่ของอัลลีลและจีโนไทป์ในยีน *CYP2D6* และ *CYP2C19* ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. Single Nucleotide polymorphism (SNP) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของลำดับเบสตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนสายดีเอ็นเอ โดย SNP นี้จะพบได้ทั้งในส่วนของยีนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสโปรตีนหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสโปรตีน ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างมนุษย์แต่ละคน
2. อัลลีล (Allele) หมายถึง ยีนที่อยู่เป็นคู่กันควบคุมการแสดงออกเฉพาะลักษณะหนึ่งๆ ยีนคู่นี้จะอยู่บนตำแหน่งเดียวกันของโครโมโซมที่เป็นคู่กัน
3. จีโนไทป์ (genotype) หมายถึง แบบของยีนที่อยู่เป็นคู่ ที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตในร่างกาย

วัสดุและวิธีการ

รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงพรรณนาแบบ ลังเกตุย้อนหลัง (retrospective observational design)

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มคนไข้โรค ซึมเศร้า (MDD) จำนวน 24 ราย กลุ่มคนที่ไม่มี ประวัติโรคทางจิตเวช (control) จำนวน 24 ราย และกลุ่มผู้ที่มีประวัติอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) จำนวน 17 รายรวมตัวอย่าง ทั้งหมด 65 ราย โดยดำเนินการเก็บตัวอย่าง เลือดและนำมาสกัดด้วยชุดสกัด DNA จากเลือด (QIAamp^R DNA Mini Kit)

วิธีการตรวจจีโนมไทป์ของยีน *CYP2D6* และ *CYP2C19* ใช้วิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อเพิ่มจำนวน DNA แบบจำเพาะโดยใช้ชุดไพรเมอร์ตามตารางที่ 1 ซึ่งเป็นชุดไพรเมอร์ ที่ได้รับการออกแบบให้เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ ยีน *CYP2D6* แบบจำเพาะและป้องกันการเพิ่ม

ปริมาณยีน *CYP2D7* และ *CYP2D8* ซึ่งเป็น ยีนที่มีลำดับเบสคล้ายคลึงกับ *CYP2D6* โดย PCR product ที่ได้จะมีขนาด 4.5 kb จากนั้น จึงนำ PCR product ที่ได้นั้นมาใช้เป็น DNA template แล้วจึงใช้ไพรเมอร์คู่ที่ออกแบบมา อย่างจำเพาะทำ PCR เพื่อให้ได้ PCR Product ที่มีขนาดเล็กลงจาก 4.5 kb เป็น PCR Product 5 ชิ้น คือ ขนาด 1,338 bp, 1,245 bp, 1,599 bp, 595 และ 591 bp ตามลำดับ ซึ่งครอบคลุม บริเวณ coding region และ promoter ซึ่ง วิธีการนี้สามารถตรวจชนิดของอัลลีลในยีน *CYP2D6* ที่มีความสัมพันธ์กับ enzyme activity ได้ไม่น้อยกว่า 17 แบบอันประกอบด้วย *1, *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *12, *14, *15, *17, *35, *41 นอกจากนี้ยังสามารถตรวจชนิดของอัลลีลในยีน *CYP2C19* ที่มีความสัมพันธ์กับ enzyme activity ได้ 3 แบบ ประกอบด้วย *1, *2 และ *3

ตารางที่ 1 ชุดไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธีการ polymerase chain reaction

ยีน	ไพรเมอร์	ลำดับเบส (5' - 3')	ขนาด (bp)	เอกสารอ้างอิง
<i>CYP2D6</i>	Long PCR			
	PA-U	GGTAAGGGCCTGGAGCAGGAA	4,500	2
	PA-L	GCCTCAACGTACCCCTGTCTC		2
	PCR 1			
	2D1F	AGGCCATCATCAGCTCC	1,338	*
	2D2R	CCTAGTGCAGGTGGTTTC		*
	PCR2			
	2D3F	TGGATGGTGGGGCTAATG	1,245	*
	2D4R	AGAGCATACTCGGGACAG		*
	PCR3			
	2D5F	CGTTCTGTCCCGAGTATG	1,599	*
	2D6R	GGGGTAAGCAGGAATGAG		*
	PCR4			
	2D7F	GGTCCACTTGATGTCGAG	595	*
	2D7R	GCACACACCTGATGGTG		*
PCR5				
2D8F	ACAGGATTTTGAAAGCAGCA	591	*	
2D8R	TGGCAGGATCATGGCTC		*	
<i>CYP2C19</i>	2C19PCR1			
	2C1F	CCAGCTAGGCTGTAATTG	457	*
	2C1R	ATGTACTTCAGGGCTTGG		*
	2C19PCR2			
	2C2F	ACCAGAGCTTGGCATATTG	355	*
	2C2R	AGCATTACTCCTTGACCTG		*

* ชุดไพรเมอร์ที่ได้รับการออกแบบโดยศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์

สารที่ใช้ในการทำ PCR ของทั้ง 2 ยีน ปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร ได้แก่ genomic DNA 100 ng, 10X buffer with $MgCl_2$ (QIAGEN), 0.2 mM dNTPs (NEB), ไพโรเมอร์แต่ละชนิด 0.5 μM (Proligo) และ 0.625 unit HotstarTaq DNA polymerase (QIAGEN) ขั้นตอนการทำ PCR ของยีน *CYP2D6* และยีน *CYP2C19* เริ่มจาก pre-denaturation ที่ 95°C เป็นเวลา 15 นาที denaturation ที่ 95°C เป็นเวลา 1 นาที annealing ที่ 49 - 60°C เป็นเวลา 90 วินาที (ขึ้นอยู่กับชนิดของไพโรเมอร์ที่ใช้) extension ที่ 72°C เป็นเวลา 1 นาที โดยทั้ง 3 ขั้นตอนทำซ้ำเป็นจำนวน 35 รอบ ตามด้วยขั้นตอนสุดท้าย คือ Final extension ที่ 72°C เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงทำ agarose gel electrophoresis เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขนาดของผลการทำ PCR หลังจากนั้น PCR product ที่ได้รับการทำให้บริสุทธิ์จะถูกส่งตรวจลำดับเบสโดยใช้วิธี bidirectional sequencing ที่บริษัท MacroGen ประเทศเกาหลี จากนั้นนำมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Sequencher version 4.7 แล้วทำการเทียบกับ Nomenclature ของแต่ละยีน^{3,4} จากนั้นแปลผลเป็นอัลลีลและจีโนไทป์ในแต่ละคนเพื่อนำไปคำนวณความถี่ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา

ผลการตรวจจีโนไทป์ในยีน *CYP2D6* ในทั้ง 65 ราย ดังตารางที่ 2 พบว่าจำนวนตัวอย่างที่มีการทำงานของเอนไซม์แบบ Extensive

metabolizer (EM) นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย โดยพบจีโนไทป์แบบ *1/*10 จำนวน 18 ราย (27.7%) รองลงคือแบบ *1/*1 พบ 10 ราย (15.4%) แบบ *2/*10 พบ 9 ราย (13.9%) แบบ *1/*2 พบ 3 ราย (4.6%) แบบ *2/*35 1 ราย (1.5%) และแบบ *10/*35 1 ราย (1.5%) อย่างไรก็ตาม พบว่าอีก 23 ราย ที่เหลือนั้นมีการทำงานของเอนไซม์แบบ Intermediate metabolizer (IM) โดยแบบ *10/*10 นั้นเป็นแบบที่พบได้มากที่สุดคือ 22 ราย (33.9%) แบบ *4/*10 พบ 1 ราย (1.5%)

จากข้อมูลจีโนไทป์ในยีน *CYP2D6* นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าชนิดอัลลีลแบบ *10 พบได้มากที่สุดคือ 56.2% (73 อัลลีล) รองลงคือ *1, *2, *35 และ *4 ดังตารางที่ 3

นอกจากนี้ผลตรวจจีโนไทป์ในยีน *CYP2C19* ในทั้ง 65 ตัวอย่างดังตารางที่ 4 พบว่าจำนวนตัวอย่างที่มีการทำงานของเอนไซม์แบบ Extensive metabolizer (EM) นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย โดยพบจีโนไทป์ แบบ *1/*1 จำนวน 31 ราย (47.7%) รองลงคือแบบ *1/*2 พบ 26 ราย (40.0%) แบบ *1/*3 พบ 1 ราย (1.5%) ส่วนจำนวนตัวอย่างที่มีการทำงานของเอนไซม์แบบ Poor Metabolizer (PM) นั้นมีทั้งสิ้น 7 ราย โดยพบจีโนไทป์แบบ *2/*2 จำนวน 6 ราย (9.2%) รองลงคือแบบ *2/*3 พบ 1 ราย (1.5%)

จากข้อมูลจีโนไทป์ในยีน *CYP2C19* นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าชนิดอัลลีลแบบ *1 พบได้มากที่สุดคือ 56.2% (73 อัลลีล) รองลงคือ *2 และ *3 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 2 ความถี่ของจีโนไทป์แต่ละแบบในยีน *CYP2D6*

Genotype	All	Control	MDD	ADR
*1/*1	10 (15.4%)	4 (16.7%)	3 (12.5%)	3 (17.7%)
*1/*2	3 (4.6%)	3 (12.5%)	0 (0%)	0 (0%)
*1/*10	18 (27.7%)	7 (29.2%)	5 (20.8%)	6 (35.3%)
*2/*10	9 (13.9%)	2 (8.3%)	5 (20.8%)	2 (11.8%)
*4/*10	1 (1.5%)	1 (4.2%)	0 (0%)	0 (0%)
*10/*10	22 (33.9%)	7 (29.2%)	10 (41.7%)	5 (29.4%)
*2/*35	1 (1.5%)	0 (0%)	1 (4.2%)	0 (0%)
*10/*35	1 (1.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (5.9%)

ตารางที่ 3 ความถี่ของอัลลีลแต่ละแบบในยีน *CYP2D6*

allele	All	Control	MDD	ADR
*1	41 (31.5%)	18 (37.5%)	11 (22.9%)	12 (35.5%)
*2	13 (10.0%)	5 (10.4%)	6 (12.5%)	2 (5.9%)
*4	1 (0.8%)	1 (2.1%)	0 (0%)	0 (0%)
*10	73 (56.2%)	24 (50.0%)	30 (62.5%)	19 (55.9%)
*35	2 (1.5%)	0 (0%)	1 (2.1%)	1 (2.9%)

ตารางที่ 4 ความถี่ของจีโนไทป์แต่ละแบบในยีน *CYP2C19*

Genotype	All	Control	MDD	ADR
*1/*1	31 (47.7%)	13 (54.2%)	10 (41.7%)	8 (47.1%)
*1/*2	26 (40.0%)	8 (33.3%)	10 (41.7%)	8 (47.1%)
*1/*3	1 (1.5%)	0 (0%)	1 (4.2%)	0 (0%)
*2/*2	6 (9.2%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	0 (0%)
*2/*3	1 (1.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (5.9%)

ตารางที่ 5 ความถี่ของอัลลีลแต่ละแบบในยีน *CYP2C19*

allele	All	Control	MDD	ADR
*1	89 (68.5%)	34 (70.8%)	31 (64.6%)	24 (70.6%)
*2	39 (30.0%)	14 (29.2%)	16 (33.3%)	6 (26.5%)
*3	2 (1.5%)	0 (0%)	1 (2.1%)	1 (2.9%)

วิจารณ์

ในยีน *CYP2D6* จากตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 65 รายพบว่าจีโนไทป์แบบ *CYP2D6* *10/*10 มากที่สุด และมีความถี่ของอัลลีลแบบ *CYP2D6* *10 มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในไทย ก่อนหน้า⁵ ถึงกระนั้นการศึกษาครั้งนี้ไม่พบ อัลลีลชนิด *5 และไม่พบ Poor Metabolizer ในกลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษา

อย่างไรก็ตามวิธีที่พัฒนาขึ้นไม่ได้ออกแบบมา เพื่อตรวจรูปแบบอัลลีลบางชนิด เช่น *1 × N, *2 × N และ *4 × N ซึ่งเป็นผลจาก gene duplication ของ *1, *2 และ *4 อันจะมีผล ให้ผู้ที่มีอัลลีลชนิดนี้มีการทำงานของเอนไซม์ เป็นแบบ Ultrarapid Metabolizer (UM) ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจะดำเนินการพัฒนาวิธีการตรวจอัลลีล ชนิดนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องการ ปรับระดับยาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการตรวจยีน *CYP2C19* นั้นพบว่า ความถี่ของอัลลีลแบบ *1, *2 และ *3 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้เช่นกัน⁶ โดยเป็นการวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มประชากรไทย กลุ่มประชากรพม่าและกะเหรี่ยง ซึ่งพบว่า

ความถี่ของแต่ละอัลลีลในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก กับผลการวิจัยดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบ Poor Metabolizer (PM) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวอย่าง โดยพบในกลุ่มควบคุม 3 ราย, กลุ่ม MDD 3 ราย และกลุ่ม ADR จำนวน 1 รายซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคนไข้ทางจิตเวชหรือไม่นั้นในแต่ละคน ก็มีความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์จากยาทั้งสิ้น ดังนั้นการตรวจยีน *CYP2D6* และ *CYP2C19* นั้นจะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้ระดับยา ให้เหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อลดความเสี่ยงจาก อันตรายอันเนื่องมาจากอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา

สรุป

วิธีการที่ทีมผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาครั้งนี้ นั้นมีศักยภาพพอเพียงที่จะต่อยอดเพื่อพัฒนาการ ตรวจให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้วิธีการนี้สามารถตรวจจีโนไทป์สำคัญ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปรับขนาดยา อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการบริการได้เนื่องจาก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจได้ อย่างมาก

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกรมสุขภาพจิตภายใต้โครงการโรคซึมเศร้า

เอกสารอ้างอิง

1. Gardiner S, Begg E. Pharmacogenetics, drug-metabolizing enzymes, and clinical practice. *Pharmacological reviews*. 2006; 58: 521-90.
2. Scarlett L, Madani S, Shen D, Ho R. Development and characterization of a rapid comprehensive genotyping assay to detect the most common variants in cytochrome P450 2D6. *Pharm Res* 2000; 17: 242-246.
3. *CYP2C19* allele nomenclature. 2011[Online]. Available from: <http://cypalleles.ki.se/cyp2c19.htm>. [2011, June 21].
4. *CYP2D6* allele nomenclature. 2011[Online]. Available from: <http://cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm>. [2011, June 21].
5. เพียรรัตน์ นาคมหาชลาสินธุ์. ความหลากหลายของยีน *CYP2D6* และผลการทำงานของเอนไซม์ *CYP2D6* ในคนไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.
6. Tassaneyakul W, Mahatthanatrakul W, Niwatananun K, Na-Bangchang K, Tawalee A, Krikreangsak N, et al. *CYP2C19* genetic polymorphism in Thai, Burmese and Karen populations. *Drug metabolism and pharmacokinetics* 2006; 21 (4) : 286-290.